

КОЛОНОСКОПИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

Помните! При недостаточной подготовке детальный осмотр слизистой толстой кишки не возможен. Несоблюдение рекомендаций по очищению кишечника приведет к увеличению времени осмотра или к необходимости повтора исследования.

Подготовка к колоноскопии при проведении осмотра до 14.00

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКГ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ НАТОЩАК (НЕ ЕСТЬ, НЕ ПИТЬ В ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ). ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ПОСТОЯННО ПРЕПАРАТЫ, СНИЖАЮЩИЕ ДАВЛЕНИЕ ИЛИ СЕРДЕЧНЫЕ, УТРОМ НУЖНО ПРИНЯТЬ ВАШУ ОБЫЧНУЮ ДОЗУ.

Вариант №1: Подготовка с помощью клизм и касторового масла.

Противопоказаний не имеет. Накануне осмотра через 1 час после легкого обеда (около 14.00) принять три столовые ложки касторового масла.

Вечером накануне осмотра сделать две клизмы каждая объемом 2,5 литра. Первая клизма в 20.00, вторая - в 22.00. Для клизм использовать прохладную воду. Утром в день осмотра так же сделать две клизмы по 2,5 литра каждая. Последняя клизма не позднее 1,5 часов до начала осмотра. В случае хронических запоров за три дня до исследования придерживаться диеты, исключая: бобовые, мучные продукты, цельное молоко. Возможен прием следующих слабительных: гутталакс, форлакс. Не рекомендуется приём магнезии и препаратов сенны.

Вариант № 2: Подготовка с помощью препарата фортранс.

Противопоказан при подозрении на кишечную непроходимость.


Три-четыре пакета фортранса растворить в 3-4 литрах теплой кипяченной воды. (Дозировка зависит от склонности к запорам и веса пациента – свыше 70 кг принимать не менее 4 литров). Принимать по 1 литру раствора в 1 час (1 стакан за 15 минут) вечером накануне осмотра с 17.00 до 21.00. При проведении осмотра днем (до 16.00), два пакета принять накануне вечером с 20.00 до 22.00 часов и еще два в день осмотра с 06.00 до 08.00 часов утра.

Вариант №3: Подготовка с помощью препаратов фортранс + эспумизан.

Противопоказан при подозрении на кишечную непроходимость.

Три-четыре пакета фортранса растворить в 3-4 литрах теплой кипяченной воды. (Дозировка зависит от склонности к запорам и веса пациента – свыше 70 кг принимать не менее 4 литров). Принимать по 1 литру раствора в 1 час (1 стакан за 15 минут) вечером накануне осмотра с 17.00 до 21.00. В последний стакан фортранса добавить 2 чайные ложки или 2 капсулы эспумизана (до полного растворения).

Для снятия нервного напряжения можно принять легкое успокаивающее средство: валериану, тазепам и т.д.



КОЛОНОСКОПИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

Помните! При недостаточной подготовке детальный осмотр слизистой толстой кишки не возможен. Несоблюдение рекомендаций по очищению кишечника приведет к увеличению времени осмотра или к необходимости повтора исследования.

Подготовка к колоноскопии при проведении осмотра после 14.00

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКГ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ НАТОЩАК (НЕ ЕСТЬ, НЕ ПИТЬ В ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ). ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ПОСТОЯННО ПРЕПАРАТЫ, СНИЖАЮЩИЕ ДАВЛЕНИЕ ИЛИ СЕРДЕЧНЫЕ, УТРОМ НУЖНО ПРИНЯТЬ ВАШУ ОБЫЧНУЮ ДОЗУ.

Вариант № 1: Подготовка с помощью клизм и касторового масла.

Противопоказаний не имеет.

Три столовые ложки касторового масла принять в 17.00 после легкого полдника накануне осмотра. Вечером накануне осмотра сделать две очистительные клизмы каждая по 2,5 литра. Первая в 21.00, вторая в 23.00. Для клизм использовать прохладную воду. Утром в день осмотра так же сделать две клизмы. Первую в 9.00, вторую в 11.00. В случае хронических запоров за три дня до исследования придерживаться диеты, исключая: бобовые, мучные продукты, цельное молоко. Возможен прием следующих слабительных: гутталакс, форлакс. Не рекомендуется приём магнезии и препаратов сенны.

Вариант № 2: Подготовка с помощью препарата фортранс.

Противопоказан при подозрении на кишечную непроходимость.

Три-четыре пакета фортранса растворить в 3-4 литрах теплой кипяченной воды. (Дозировка зависит от склонности к запорам и веса пациента – свыше 70 кг принимать не менее 4 литров). Принимать по 1 литру раствора в 1 час (1 стакан за 15 минут). При проведении осмотра днем (до 16.00), два пакета принять накануне вечером с 20.00 до 22.00 часов и еще два в день осмотра с 06.00 до 08.00 часов утра. При проведении осмотра после 14.00 часов дня, принять 4 пакета фортранса в день осмотра с 06.00 до 10.00 часов утра.

Вариант №3: Подготовка с помощью препаратов фортранс + эспумизан.

Противопоказан при подозрении на кишечную непроходимость.

Три-четыре пакета фортранса растворить в 3-4 литрах теплой кипяченной воды. (Дозировка зависит от склонности к запорам и веса пациента – свыше 70 кг принимать не менее 4 литров). Два пакета принять накануне вечером с 20.00 до 22.00 часов и еще два в день осмотра с 06.00 до 08.00 часов утра. При проведении осмотра после 16.00 часов возможен прием 4 пакетов фортранса в день осмотра с 06.00 до 10.00 часов утра. В последний стакан фортранса добавить 2 чайные ложки или 2 капсулы эспумизана (до полного растворения).

Для снятия нервного напряжения можно принять легкое успокаивающее средство: валериану, тазепам и т.д.